





Научная библиотека Государственного образовательного учреждения
высшего образования Луганской народной республики
«Донбасский государственный технический институт»

СПИД – РАНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА





1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом





- Мир узнал о новом заболевании в 1978 году, но только в 1982 году впервые используется название СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
- Всемирный День борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДУ

- В апреле 1991 года, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа, художник Франк Мур создает красную ленточку - официальный международный символ борьбы против СПИДа. Очень быстро красная ленточка стала символом борьбы со СПИДом, популярным в самых широких слоях общества




**Американский художник
Франк Мур (1954-2002)**

ВИЧ - вирус
иммунодефицита человека.

СПИД - синдром
приобретенного
иммунодефицита.



Иммунодефицит - это
состояние, когда защитная
система разрушена
настолько, что не в
состоянии бороться с
любыми, даже самыми
безобидными
заболеваниями.





В мире ежедневно происходит более 5,5 тысяч новых заражений ВИЧ-инфекцией. СПИД является главной причиной смертности среди женщин и девушек детородного возраста (15-49 лет) в мире. Около 14 миллионов детей остались сиротами из-за СПИДа.

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохранения, развития и прав человека, социальную сферу. Ежегодная заболеваемость ВИЧ-инфекцией остается относительно неизменной последние пять лет и составляет около 2,6 миллиона новых случаев инфицирования в год.





Число ВИЧ-инфицированных в миллионах


В политической декларации по ВИЧ и СПИДу «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой в июне 2016 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выражается серьезная обеспокоенность по поводу того, что более одной трети всех новых случаев заражения ВИЧ приходится на долю молодых людей в возрасте 15-24 лет.

Ежедневно ВИЧ заражаются около 2000 молодых людей, что показатели смертности подростков от СПИДа повышаются, в результате чего СПИД вышел на второе место среди основных причин смертности подростков в мире.

СПИД – чума XXI века



ВИЧ



Причина СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от заболеваний

СПИД



Стадии развития СПИДа

0 стадия:


- ◆ инкубационный период
- ◆ длительность до 3 месяцев

1 стадия:

- ◆ острая инфекция, протекает как «гриппоподобное заболевание»
- ◆ длительность от 3 до 9 месяцев
- ◆ узнают о наличии ВИЧ по антителам в крови

2 стадия:

- ◆ асимптомная инфекция. Полное отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции
- ◆ длительность до 3-5 лет
- ◆ больные при наличии половых контактов заражают других



СПИД передается только
от человека к человеку:

1) половым
путем;



2) через
кровь,
содержащую
вирус
иммуно-
дефицита;

3) от матери
к плоду и
ново-
рожденному



ПЕРЕДАЧА СПИДА

Как происходит заражение?
Источником заражения служит человек, пораженный вирусом иммунодефицита. Это может быть **БОЛЬНОЙ** с различными проявлениями болезни, или человек, который является носителем вируса, но не имеет признаков заболевания (**бессимптомный вирусоноситель**)

СПИД не передается:

- при рукопожатии
- при поцелуе
- через столовые приборы
- при пользовании общим туалетом
- через слезы, слюну и при чихании и кашле
- через укусы насекомых
- через укусы животных
- при совместном купании в бассейне
- при нахождении в одном помещении или комнате с больным ВИЧ-инфекцией



Профилактика ВИЧ:

- избегайте случайных половых партнеров
- откажитесь от приема наркотиков
- чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, следует соблюдать предписания лечащего врача
- периодически проходите обследование на предмет наличия ВИЧ



Лечение ВИЧ-инфекции



Лечение больных ВИЧ-инфекцией проводится на добровольной основе и включает в себя следующие направления:

- психосоциальная адаптация пациента;
- антиретровирусная терапия;
- химиопрофилактика вторичных заболеваний;
- лечение вторичных и сопутствующих заболеваний.

Проводится пожизненно





Никто не задумывается о наблевших проблемах современности. Все обходят их стороной. СПИД – чума XXI века. Это болезнь, которая охватила весь мир. Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно вовремя осознать проблему, вовремя понять ситуацию.

Выбери жизнь!


СПИД распространяется из-за нашего невежества, нежелания изменить нормы своего поведения. Единственный путь беречь себя, своих друзей, родных от страшной болезни - это здоровый образ жизни.



*Продлим жизнь
вместе*



ЗНАЮ
ПОДДЕРЖИВАЮ
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ



КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

